



Mais

Ottenere elevate rese con granella di qualità

BluRain, localizzato in banda, fornisce una nutrizione equilibrata. L'efficienza è massimizzata sia grazie all'**alta solubilità delle materie prime** che dalla capacità del concime di continuare a scambiare acqua ed elementi nutritivi (ione ammonio (N), calcio, magnesio, potassio, ecc..) **rendendoli disponibili alla pianta per un periodo di durata maggiore.**

Universal Up è un concime NP che, localizzato in banda alla semina, contribuisce a una **pronta e vigorosa emergenza e accompagna il mais nelle prime fasi vegetative.** Il fosforo altamente solubile è inoltre arricchito con acidi umici che lo proteggono dal fenomeno della retrodegradazione.

CereaSlow 40 e CereaSlow 33 sono concimi contenenti azoto in due diverse forme: ammoniacale ed ureico. **La componente ureica è stabilizzata con NBPT**, l'inibitore dell'ureasi che permette di ridurre le perdite d'azoto per volatilizzazione dell'ammoniaca. Lo zolfo inoltre migliora l'assorbimento dell'azoto.

NaturBlack utilizzato per via fogliare, ha azione fisioattivante e **grazie al pH basso migliora l'efficienza dei diserbi e prodotti ad esso miscelati.** La sua azione è particolarmente marcata in situazioni di forte stress per la pianta (diserbi, sbalzi termici, grandine, ecc).

Leaf N Fast contiene azoto e magnesio prontamente assimilabili che potenziano l'attività fotosintetica. **Lo zolfo migliora ulteriormente l'assorbimento dell'azoto.** Sono inoltre presenti i liginsolfonati che veicolano e massimizzano l'assorbimento dei prodotti associati.



Coltivare bene per mangiare meglio



Linea tecnica

Prodotto	Dosaggio	Trattamento	Periodo
BLURAIN oppure UNIVERSAL UP (alternativa in caso si sia già distribuito del potassio)	200-250 kg/ha oppure 250-300 kg/ha	Al terreno	Alla semina, localizzato in banda
NATURBLACK	1,5 l/ha	Fogliare	4-7 foglie (con i diserbi post-emergenza)
CEREASLOW40 oppure CEREASLOW46	350-400 kg/ha 300 - 350 kg/ha	Fertirrigazione	Sarchiatura. Preferibile la distribuzione in due passaggi
LEAF N-FAST	10-20 l/ha	Fogliare	Trattamento piralide

Per **mais non irrigui a ciclo breve** si consiglia l'applicazione in sarchiatura di **CereaSlow 33** con il dosaggio di 300 - 400 kg/ha (preferibile la distribuzione in due passaggi).



per ulteriori dettagli: agronomia@fcpccerea.it
www.fcpccerea.it

