



BiZzar

Sinergia nutrizionale per tessuti più compatti

BIZZAR è un formulato liquido che soddisfa le richieste nutrizionali più esigenti delle colture, combinando Boro e Zinco in un legame sinergico ad altissima assimilabilità. BIZZAR accelera i processi biochimici chiave, garantendo fioriture omogenee, allegagioni più uniformi e uno sviluppo vegetativo vigoroso. Boro e zinco sono complessati da molecole biologiche vegetali che agiscono come carrier efficiente per garantire una massima penetrazione, un assorbimento cuticolare più veloce (grazie all'affinità delle matrici complessanti) e una massima selettività e sicurezza (nessun problema di fitotossicità anche nei momenti di massimo stress termico o idrico).



TIPOLOGIA
Liquido



CONFEZIONE



Benefici

- Attivazione del metabolismo della pianta: lo zinco stimola la sintesi delle auxine e l'allungamento cellulare; il boro ne catalizza il trasporto e ottimizza la fertilità del polline;
- Ripristino delle riserve nutritive della pianta post-raccolta;
- Fiori più robusti e resistenti a stress ambientali;
- Tessuti vegetali più compatti e resistenti.

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua	2%
Zinco (Zn) solubile in acqua	7%

DENSITÀ

1,33 +/- 0,05 kg/dm³

Colore e densità sono da considerarsi indicativi. Per gli avvisi di pericolo vedere 156.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE	DOSAGGIO FOGLIARE	DOSAGGIO RADICALE	EPOCA
Drupacee	2-3 l/ha	4-5 l/ha	Pre-fioritura, post-fioritura, post-raccolta
Pomacee	2-3 l/ha	4-5 l/ha	Pre-fioritura, post-fioritura, post-raccolta
Vite da vino e da tavola	2-3 l/ha	4-5 l/ha	Pre-fioritura, post-fioritura, post-raccolta
Agrumi	2-3 l/ha	4-5 l/ha	Pre-fioritura,, post-fioritura, post-raccolta
Actinidia	2-3 l/ha	4-5 l/ha	Pre-fioritura, post-fioritura, post-raccolta
Noce, nocciolo	2-3 l/ha	4-5 l/ha	Pre-fioritura, post-fioritura, post-raccolta
Olivo da olio e da mensa	2-3 l/ha	4-5 l/ha	Pre-fioritura, fine fioritura, post-raccolta
Orticole a frutto pieno campo	2-3 l/ha	4-5 l/ha	Pre-fioriture, allegagioni palchi interessati
Orticole in serra	2-3 l/ha	4-5 l/ha	Pre-fioriture, allegagioni palchi interessati
Orticole a foglia	2-3 l/ha	4-5 l/ha	Pre-fioriture, allegagioni palchi interessati
Patata, carota, cipolla, aglio, porro	2-3 l/ha	4-5 l/ha	Pre-fioriture, allegagioni palchi interessati