

NANO.T® Chitosano

Difesa attiva contro stress e siccità



NANO.T® Chitosano rappresenta l'evoluzione tecnologica del chitosano standard, un polimero naturale derivato dalla chitina. Grazie alla riduzione in scala nanometrica, le sue proprietà biologiche e meccaniche risultano notevolmente potenziate. NANO.T® CHITOSANO è un prodotto ad azione elicitoria naturale che aumenta la resistenza delle piante a stress ambientali. NANO.T CHITOSANO aiuta anche la pianta in caso di siccità, "aiutandola" a ottimizzare la chiusura dei pori durante le ore calde, riducendone le perdite d'acqua.

NANO.T CHITOSANO applicato in fase di pre-raccolta crea una pellicola invisibile che funge da barriera per i frutti.

Benefici

- Elevato rapporto superficie/volume: maggiore reattività chimica e maggiore capacità di penetrazione attraverso la cuticola fogliare, effetto più veloce ed immediato;
- Piante più resistenti a stress ambientali;
- Frutti più sani nel pre-raccolta;
- Piante più produttive soprattutto in caso di siccità e/o scarsità idrica.

NANO.T

TIPOLOGIA
Liquido



CONFEZIONE



COMPOSIZIONE

Chitosano cloridrato	3%
Grado di deacetilazione	> 90 %
Metalli pesanti	< 40 ppm

Non miscelare con rame e/o prodotti contenenti rame.

DENSITÀ

1,02 +/- 0,05 kg/dm³

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Culture	Dosaggi (l/ha) (g/ha di sost. attiva)	Dosaggi (l/ha)	Modalità	Epoca	Intervalli tra le applicazioni
Olivo	0,5 - 1 (15-30)	2-4 l/ha	Fogliare	Da ripresa vegetativa a ingrossamento frutti	2 sett
Vite	0,5 - 1 (15-30)	2-4 l/ha	Fogliare	Da germogliamento a chiusura grappolo	2 sett
Kiwi	0,5 - 1 (15-30)	2-4 l/ha	Fogliare	Da ripresa vegetativa a ingrossamento frutti	2 sett
Orticole (pieno campo e serra)	0,5 - 1 (15-30)	2-4 l/ha	Fogliare	Da sviluppo vegetativo a ingrossamento frutti	2 sett
Orticole a foglia	0,5 - 1 (15-30)	2-4 l/ha	Fogliare	Da sviluppo foglie a metà ciclo	2 sett
Frutticole (pomacee, drupacee ecc)	0,5 - 1 (15-30)	2-4 l/ha	Fogliare	Da ripresa vegetativa	2 sett
Fragola e piccoli frutti (lampone, mora, frutti di bosco ecc)	0,5 - 2 (15-30)	1-8 l/ha	Fogliare	Da sviluppo vegetativo, a post-allegagione	2 sett
Culture estensive (tabacco, bietole, barbabietole, girasole ecc)	0,5 - 1 (15-30)	1-4 l/ha	Fogliare	Da sviluppo vegetativo	5-7 giorni