CEREA FCP

Melo

Ottenere frutti croccanti, saporiti e con buona conservabilità



Hydrostar BTC è efficace a bassi dosaggi grazie all'alta qualità delle materie prime e **svolge un'azione di radicazione e rinforzo della pianta** promuovendo nel contempo la fioritura, grazie alla presenza di estratti puri dell'alga *Ascophyllum nodosum*.

NaturBlack unito a **Leaf N-Fast** favorisce una rapida ripresa vegetativa grazie all'**effetto starter** del fosforo totalmente assimilabile e agli acidi umici e fulvici che contribuiscono a migliorare la **resistenza della coltura agli stress.**

L'alto tenore in N organico e gli amminoacidi presenti in **Giove Bio Gold** favorisce il recupero della pianta dagli stress (prolina). **Giove Bio Gold migliora l'efficacia dei prodotti associati grazie all'azione veicolante (glicina).**

Nano.T CaPO previene e cura le carenze di calcio e contribuisce a rinforzare i tessuti vegetali **limitando il fenomeno del cracking.**

Crisco contribuisce a migliorare e uniformare la pezzatura dei frutti.

Leaf P-Ca grazie l'alta concentrazione di fosforo e calcio completamente solubili **promuove la fioritura e l'ingrossamento del frutto, mantenendo la consistenza.**

SuprEmo è ricco in amminoacidi essenziali e in ferro organico, biologicamente molto attivo. **Il suo utilizzo in maniera costante permette di mantenere le piante verdi e attive**. Associato ad altri fertilizzanti ne promuove l'assimilazione da parte della pianta.

CalcioMagno migliora sensibilmente conservabilità e compattezza dei frutti e ne incrementa la pezzatura. Stimola al contempo la fotosintesi grazie al contenuto di calcio e magnesio. Gli acidi organici presenti migliorano l'assimilazione di altri nutrienti nel terreno.

Glycos Plus stimolando la produzione di pigmenti, **promuove la colorazione dei frutti senza comprometterne la conservabilità**. Il potassio e lo zolfo migliorano le caratteristiche organolettiche della frutta.



Coltivare bene per mangiare meglio

Linea tecnica

	Prodotto	Dose	Note	Epoca	Applicazione
	Red Ball	500-700 kg/ha		Ripresa vegetativa	Al terreno
	Hydrostar BTC	10-15 kg/ha	2 interventi a 12-15 gg		Fertirrigazione
	Giove Bio Gold + **Febo Mix**	1,5-2 kg/ha + 1-1,5 kg/ha	2-3 interventi a 12-15 gg	Sviluppo vegetativo a prefioritura	Fogliare
	Leaf N Fast + **NaturBlack**	10 l/ha + 1,5 l/ha		Prefioritura	Fogliare
	NaturBlack + **Crisco** + **Nano.T CaPO**	1-1,5 l/ha + 1 l/ha + 4-5 l/ha		Post Fioritura (caduta petali)	Fogliare
	Crisco + **Nano.T CaPO**	1 l/ha + 4-5 l/ha		(dopo 10-12 gg) Post allegagione	Fogliare
	CalcioMagno + **SuprEmo***	15-20 l/ha + 20 l/ha	2 interventi a 12-15 gg *L'uso di SuprEmo con gli altri concimi minerali migliora l'assorbimento dei nutrienti.	Post allegagione Ingrossamento frutti	Fertirrigazione
	Leaf P-Ca + **Giove Bio Gold**	5 l/ha + 1-1,5 kg/ha	3 interventi: 20 gg dopo fioritura 35 gg dopo fioritura 50 gg dopo fioritura	Post allegagione Ingrossamento frutti	Fogliare
Varietà rosse	**Glycos Plus**	2 l/ha x intervento	1° applicazione: 45 gg prima della raccolta 2° applicazione: 30 gg prima della raccolta 3° applicazione: 15 gg prima della raccolta	Invaiatura e maturazione	Fogliare
Varietà gialle	**Leaf K**	3-4 l/ha x intervento	3 applicazioni da invaiatura		Fogliare

In caso di terreni salini, sodici e calcarei si consiglia l'utilizzo di **CALCITO** in fertirrigazione a **10 l/ha, ogni 10-15 gg**. In caso di terreni particolarmente calcarei ed acque particolarmente saline aumentare la dose a 20 l/ha.

Per rinforzare e rendere la pianta più resistente a stress biotici e abiotici si consiglia l'utilizzo di **Nano.T Cu** (**Nano.T Cu Bio**) fogliare alla dose di **200-250 ml/hl ogni 15 gg** da sviluppo vegetativo in poi.

Per problematiche di clorosi ferrica si consiglia di intervenire con **Nano.T Fe** alla dose di **5 l/ha via radicale**. Applicazioni in: germogliamento, prefioritura, ingrossamento frutto e post raccolta.

per ulteriori dettagli: agronomia@fcpcerea.it
www.fcpcerea.it