CEREA FCP

Uva da tavola

Migliorare l'attività fotosintetica della pianta, gestire la clorosi ferrica e ridurre il rischio di spaccature aumentando la shelf life.

HydroStar è un formulato composto da materie prime purissime ed estremamente solubili, con un'elevata percentuale di azoto organico. É un prodotto efficace a **bassi dosaggi, svolge un'azione di radicazione e rinforzo della pianta promuovendo nel contempo la fioritura,** grazie alla presenza di estratti puri dell'alga Ascophyllum nodosum.

VigorGreen è un concentrato di alga Ascohpyllum Nodosum d'origine canadese estratta a freddo. I microelementi associati (Ferro chelato DTPA, boro complessato e molibdeno) **stimolano il metabolismo della pianta migliorando fioritura, allegagione e uniformità di produzione.**

Crisco è un concentrato di alga Ascophyllum Nodosum Canadese (25%), ricca di sostanze biologicamente attive che promuovono la divisione cellulare. **Ottimizza e migliora l'assorbimento dell'azoto e promuove l'allungamento del rachide.**

Giove Bio Gold, ricco di amminoacidi vegetali, ha effetto **antistress e veicolante**.

SuprEmo ricco in amminoacidi essenziali e di ferro organico, biologicamente molto attivo. Il suo utilizzo in maniera costante permette di mantenere le piante verdi e attive.

Calcito migliora **l'assorbimento del calcio e di altri nutrienti importanti.** Un corretto assorbimento del calcio riduce il rischio del disseccamento del rachide, di **spaccature dell'acino e incrementa la qualità delle bacche** dal punto di vista della croccantezza, della serbevolezza e della conservabilità.

Glycos Plus stimolando la produzione di **pigmenti** (antociani e carotenoidi), determina una maggiore **uniformità nella colorazione dell'uva.**

Nano.T CaPO previene e cura le carenze di calcio e contribuisce a rinforzare i tessuti vegetali **limitando il fenomeno del distacco degli acini.**

HydroNova BTC è un fertilizzante idrosolubile di elevata qualità al altissimo contenuto in fosforo e potassio, attivato con acidi umici. usato nelle fasi della maturazione promuove l'ingrossamento (fosforo) e la quoalità dei frutti senza rischi di sovramaturazione



Coltivare bene per mangiare meglio

Linea tecnica


Prodotto	Dosaggio	Trattamento	Periodo
HYDROSTAR*	10 kg/ha	Fertirrigazione	Alla ripresa vegetativa e allo sviluppo dei germogli
VIGORGREEN	1-1,5 L/Ha	Fogliare ogni 10-12 gg	Da sviluppo germogli a prefioritura
HYDROSTAR*	10 kg/ha	Fertirrigazione	Prefioritura
VIGORGREEN	1,5 l/ha	Fogliare	
VIGORGREEN	1,5 l/ha	Fogliare	Fine fioritura
CRISCO + NANO.T CAPO	1 l/ha + 4-5 l/ha	Fogliare	Allegagione / post-allegagione
SUPREMO*	20 l/ha	Fertirrigazione	Allungamento grappolo
GIOVE BIO GOLD + CRISCO	1 l/ha + 1 l/ha	Fogliare	
NANO.T CAPO + GIOVE BIO GOLD + GLYCOS PLUS	4-5 l/ha + 1,5 kg/ha + 2 l/ha	Fogliare	Ingrossamento acino
CALCITO	10 l/ha	Fertirrigazione	
NANO.T CAPO + GIOVE BIO GOLD	4-5 l/ha + 1,5 l/ha	Fogliare	Chiusura grappolo
CALCITO	10 l/ha	Fertirrigazione	
GLYCOS PLUS + NANO.T CAPO	2 l/ha + 4-5 l/ha	Fogliare	Invaiatura
CALCIOMAGNO + SUPREMO	20 l/ha + 20 l/ha	Fertirrigazione	
GLYCOS PLUS + HYDRONOVA	2 l/ha + 2-2,5 kg/ha	Fogliare	Dopo 10-15 gg
CALCIOMAGNO + SUPREMO	20 l/ha + 20 l/ha	Fertirrigazione	Dopo altri 10-15 gg
HYDRONOVA	2-2,5 kg/ha	Fogliare	Post-raccolta

* in caso di problematiche di clorosi ferrica aggiungere **Nano.T Fe 5 l/ha,** un prodotto nanotecnologico che non precipita e non si dilava e fornisce una riserva di ferro di lungo periodo.

per ulteriori dettagli: agronomia@fcpcerea.it
www.fcpcerea.it

Risultati delle prove condotte a Trani (BAT) nel 2024

- Varietà: Regal



Il monitoraggio SPAD è stato eseguito dopo 15 giorni da ciascuna applicazione.

Nel grafico è possibile osservare l'andamento della concentrazione della clorofilla (indice SPAD) nelle tesi in prova:

- tesi 1: testimone senza alcun apporto di ferro
- tesi 2: apporto di **Nano.T Fe** 6 l/ha
- tesi 3: apporto di chelato EDDHA 15 kg/ha

La tesi trattata con Nano.T Fe ha dimostrato già dalla prima applicazione un vigore superiore a quella in cui si è impiegato il prodotto chelato pur utilizzando una quantità molto inferiore di ferro:

Fase fenologica	Dosaggio totale di Chelato	**Dosaggio totale di Nano.T Fe**
Ripresa vegetativa	15 kg/ha	**5,6 litri/ha**
Sviluppo fogliare	15 kg/ha	**5,6 litri/ha**
Fioritura	15 kg/ha	**5,6 litri/ha**
Allegagione	15 kg/ha	**5,6 litri/ha**

Tot: 60 Kg di Chelato vs 22.4 Litri di Nano.T Fe

- Varietà: Supernova



TEST: colorazione scarsa e non uniforme nel prodotto non trattato (agosto)



TESI FCP: colorazione intensa e uniforme nella tesi trattata con Glycos Plus (agosto)

Nelle foto si osserva l'effetto dell'applicazione di Glycos Plus sulla colorazione dell'uva:

- tesi 1: testimone non trattato
- tesi 2: apporto di Glycos Plus 2 l/ha per 3 applicazioni

Nella tesi trattata si è osservata una durezza della bacca analoga alla tesi testimone, garanzia di buona conservabilità.



Spaccatura circolare causata da carenza di calcio presente nelle tesi senza Calcito.

Prova condotta da FCP a Grottaglie (Ta) nel 2020

per ulteriori dettagli: agronomia@fcpcerea.it
www.fcpcerea.it



CATALOGO PRODOTTI

CEREA FCP

Via Farfusola 6, 37050
Bonavicina di S. Pietro di Morubio (VR) - Italy
Tel. +39.045.7125911 - Fax +39.045.7125544
fcpcerea@fcpcerea.it - www.fcpcerea.it

per ulteriori dettagli: agronomia@fcpcerea.it

www.fcpcerea.it