

Giove Bio Gold

100% amminoacidi vegetali

bioagricert 



GIOVE BIO GOLD ha un'elevatissima concentrazione di amminoacidi vegetali (98%) in catene medio corte ad azione fitostimolante, antistress e nutrizionale. GIOVE BIO GOLD è efficace a bassi dosaggi grazie alla formulazione in polvere ad altissima solubilità. GIOVE BIO GOLD è rapidamente assorbito e attiva il metabolismo della pianta permettendo un sviluppo ottimale e un rapido recupero delle piante stressate e/o bloccate.

Benefici

- Elevata efficacia a bassi dosaggi grazie all'altissima concentrazione di amminoacidi;
- Azione biostimolante grazie alla elevata presenza di peptidi, oligopeptidi e amminoacidi liberi, tutti di origine vegetale;
- Attivazione del metabolismo della pianta grazie all'elevato contenuto di azoto organico totalmente solubile;
- È ecosostenibile e innovativo poiché proveniente dall'idrolisi enzimatica di tessuti vegetali;
- È facile da impiegare grazie all'elevata solubilità;
- Incrementa l'efficacia dei prodotti distribuiti insieme, grazie all'azione coformulante della matrice amminoacidica.



TIPOLOGIA

Polvere Idrosolubile



CONFEZIONE



COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	16%
Carbonio (C) organico	50%
pH	6,5

CONTIENE ANCHE:

Amminoacidi totali	98%
di cui Glicina	25,5%
di cui Prolina	14%

DENSITÀ

0,60 +/- 0,05 kg/dm³

Colore e densità sono da considerarsi indicativi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE	DOSAGGI	EPOCA	MODALITÀ
Frutticole (pesco, nettarina, albicocco, susino, melo, pero, kiwi)	1-2 kg/ha	alla ripresa vegetativa, in pre-fioritura, post allegazione, sviluppo dei frutti	fogliare
Vite da vino e da tavola	1-2k g/ha	pre-fioritura, fioritura, grano di pepe, in fase di ingrossamento acino	fogliare
Olivo	1-2 kg/ha	pre-fioritura, fioritura, mignolatura, fase di ingrossamento olive	fogliare
Nocciolo	2 kg/ha	da allegazione	fogliare
Orticole pieno campo (patata, pomodoro, carciofo...)	1-3 kg/ha	post-trapianto/post emergenza, sviluppo vegetativo, post allegazione, sviluppo del frutto	fogliare
Orticole in serra	300-500 g/1000m ²	3-4 applicazioni a partire da 10-15 giorni dopo il trapianto	fogliare
Cereali	1-2 kg/ha	accestimento, foglia a bandiera	fogliare
Tutte le colture	5-6 kg/ha	2-4 applicazioni in base alle necessità della coltura	fertirrigazione