

NANO.T® Chitosano cloridrato

Attivatore dei meccanismi di autodifesa



NANO.T® Chitosano cloridrato rappresenta l'evoluzione tecnologica del chitosano standard, un polimero naturale derivato dalla chitina. Grazie alla riduzione in scala nanometrica, le sue proprietà biologiche e meccaniche risultano notevolmente potenziate.

NANO.T® CHITOSANO è un prodotto ad azione elicitoria naturale che aumenta la resistenza delle piante a stress. NANO.T CHITOSANO aiuta anche la pianta in caso di siccità, "aiutandola" a ottimizzare la chiusura dei pori durante le ore calde, riducendone le perdite d'acqua.

NANO.T CHITOSANO applicato in fase di pre-raccolta crea una pellicola invisibile che funge da barriera per i frutti.

Benefici

- Elicitore dei meccanismi di autodifesa della pianta nei confronti di **FUNGHI E BATTERI**;
- Elevato rapporto superficie/volume: maggiore reattività chimica e maggiore capacità di penetrazione attraverso la cuticola fogliare, effetto più veloce ed immediato;
- Piante più resistenti a stress ambientali;
- Frutti più sani nel pre-raccolta;
- Piante più produttive soprattutto in caso di siccità e/o scarsità idrica.

NANO.T

TIPOLOGIA
Liquido



CONFEZIONE



COMPOSIZIONE

Chitosano cloridrato **3%**

Purezza: Farmacopea Europea

Metalli pesanti **< 40 ppm**

DENSITÀ

1,08 +/- 0,05 kg/dm³

Colore e densità sono da considerarsi indicativi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

coltura	epoca	N° (min/max) applicazioni	Intervallo minimo	Dosaggio (Litri) in 100 litri di acqua	Dosaggio (litri) a ettaro (min/max)
Bacche e piccola frutta (uva, fragole, more, mirtilli, ribes, ecc.)	Dalla comparsa della prima foglia sino allo sviluppo del frutto	4-8	2 settimane	1,5-6,5	3-26
Vite				1,5-3,3	3-20
Arboree				1,5-3,3	3-13
Ortaggi, Cereali, Spezie e Foraggiere				1,5-3,3	3-13
Piante ornamentali bulbose	Dalla comparsa della prima foglia sino a fine ciclo	1-8	5/7 giorni	1,5-6,5	3-26
Seminativi, bietola		1-8	5/7 giorni	1,5-6,5	3-26