NANO.T® Fe

TECNOLOGIA FCP CEREA BREVETTATA

Nano.T® Fe è un nuovo approccio al mondo della nutrizione vegetale, con un apporto inferiore di nutriente, si raggiungono gli stessi risultati. Si caratterizza per una maggiore efficacia e un minor impatto ambientale rispetto ai fertilizzanti convenzionali a base di ferro.
Il nano-ferro (particelle di dimensioni <100 nm) contenuto in Nano.T® Fe è in sospensione colloidale, viene trattenuto dal suolo e resta disponibile per la pianta. Consigliato per le colture arboree (drupacee, pomacee, piccoli frutti, kiwi, ecc.) ed orticole (serra: sia in suolo che in fuori suolo; pieno campo). Si applica in fertirrigazione e raggiunge la massima efficacia con interventi ripetuti a basso dosaggio.

FORMULAZIONE

Fe

Benefici

- Migliora produttività e qualità delle produzioni evitando clorosi dovute alla carenze di ferro
- Previene le clorosi poiché permette alla pianta di creare riserve
- Aumenta l'efficacia del ferro perché non è fotolabile e non viene disattivato dal suolo
- Migliora l'efficacia delle concimazioni grazie al pH acido e alla capacità di stimolare lo sviluppo radicale della pianta
- Riduce l'impatto ambientale non essendo lisciviabile

Composizione e titolo

Ferro (Fe)	Ferro (Fe)	pH
3.0% (1)	2.0% (2)	1.3

(1) totale - (2) solubile in acqua

CONFEZIONE

TIPOLOGIA
LIQUIDO

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Dosaggi	Epoca
kiwi	4-5 l/ha	2-3 appl. ogni 10-12 giorni dalla ripresa vegetativa fino a ingrossamento frutti
melo / pero	4-5 l/ha	2-3 appl. ogni 10-12 giorni dalla ripresa vegetativa fino a ingrossamento frutti
drupacee	4-5 l/ha	2-3 appl. ogni 10-12 giorni dalla ripresa vegetativa fino a ingrossamento frutti
vite (da vino e da tavola)	3-4 l/ha	2-3 appl. ogni 10-12 giorni dalla ripresa vegetativa fino a ingrossamento frutti
agrumi	5-7 l/ha	2-3 appl. ogni 12-15 giorni dalla ripresa vegetativa fino a ingrossamento frutti
ornamentali	3-7 g/m^2	applicare in 2-3 trattamenti
orticole pieno campo	3-4 l/ha	applicare in 1-2 trattamenti
orticole in serra (pomodoro, melanzana, cetriolo, peperone, melone, ecc.)	300-600 g/1000m^2	eseguire un'applicazione ogni 5-7 giorni da post-trapianto
piccoli frutti (mirtilli, more, lamponi, fragole ecc...)	2-3 l/ha	eseguire applicazioni ripetute a partire dalla ripresa vegetativa